

# ANTI DIAREX

Suspensión oral



## Composición:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Atapulgita activada        | 7 g         |
| Neomicina (sulfato)        | 0,5 g       |
| Sulfadimidina (sódica)     | 1,2 g       |
| Tetraciclina (clorhidrato) | 0,2 g       |
| Tylosina (tartrato)        | 0,2 g       |
| Vitamina A                 | 200.000 U.I |
| Vitamina C                 | 0,5 g       |
| Vitamina B <sub>1</sub>    | 150 mg      |
| Vitamina B <sub>2</sub>    | 150 mg      |
| Vitamina B <sub>6</sub>    | 150 mg      |
| Excipiente c.s.p.          | 100 ml      |

## Presentación:

Envase de 200 ml.

## Indicaciones:

Lechones, corderos, cabritos y terneros: Tratamiento preventivo y curativo de Enteritis bacterianas de diversa etiología, Colibacilosis y Salmonelosis.

## Administración y posología:

Agitar el frasco y administrar por vía oral.

Lechones, corderos y cabritos de menos de 15 días: 1 a 2 ml/animal/cada 12 horas, durante 3 a 5 días.

Lechones, corderos y cabritos hasta 5 semanas: 2 a 4 ml/animal, cada 12 horas, durante 3-5 días.

Terneros: 15 a 20 ml/ternero/cada 12 horas, durante 3 a 5 días.